

Федеральное агентство научных организаций
(ФАНО России)

ФГБНУ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА ИМ. АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА
(ВИЖ им. Л.К. Эрнста)

УДК 636.2.034 +636.2.087.8

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВИЖ им. Л.К. Эрнста,
академик РАН

_____ Н.А. Зиновьева

«____» _____ 2016 г.

ОТЧЕТ

в рамках договора №298 с ООО «ИЦ «Промбиотех» от 01.08.2016 года на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Определить эффективность скармливания биотехнологической продукции (пробиотики) в рационах крупного рогатого скота».

Продолжение на следующем листе

- Дубровицы, 2016 г. -

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы,
Ведущий научный сотрудник
ник, руководитель лабора-
тории,
кандидат с.-х. наук, доцент

подпись, дата

Р.В. Некрасов
(раздел 1 - 6)

Исполнители темы:

Главный научный сотруд-
ник,
доктор с.-х. наук, профес-
сор

подпись, дата

М.Г. Чабаев
(раздел 1 - 6)

Младший научный со-
трудник

подпись, дата

А.А. Зеленченкова
(раздел 1-6)

Лаборант

подпись, дата

Т.С. Жарова
(раздел 4)

Нормоконтролер

Ведущий научный сотруд-
ник, кандидат биологиче-
ских наук

подпись, дата

А.С. Аникин

РЕФЕРАТ

Отчёт 36 стр., 8 таблиц, 47 источников литературы.

КОРОВЫ, ПРОБИОТИК, УДОЙ, МОЛОКО, БИОХИМИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Объектом исследования является пробиотик на основе спорообразующих бактерий производства ООО «ИЦ «Промбиотех» (Энзимспорин), который возможно применять в составе (в смеси) комбикормов-концентратов для молочных коров.

С целью получения данных об эффективности скармливания пробиотика был проведен научно-хозяйственный опыт на базе СПК «Агрофирма Красная Звезда» Вологодского района Вологодской области, а также в лаборатории БУВВО «Вологодской областной лаборатории» г. Вологда, в лабораториях ВИЖа им. Л.К. Эрнста Подольского района Московской области, на коровах айрширской породы, разделенных по принципу аналогов на две группы: контрольную и опытную. Животные 2-й опытной группы получали пробиотик в смеси с концентратами. Была испытана 1 дозировка препарата Энзимспорин - 12 г/гол./сут.

Скармливание изучаемого пробиотика в количестве 12 г/гол. в сутки коровам в период проводимого опыта приводило к стабилизации среднесуточных удоев при увеличении его уровня в сравнении с контролем на 4,66% по молоку натуральной жирности и на 8,67% по молоку базисной жирности, при снижении затрат кормов на единицу получаемой продукции.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения:

А/Г	Альбумино-глобулиновое отношение
АЛТ	Аланинаминотрансфераза
ACB	Абсолютно сухое вещество
АСТ	Аспартатаминотрансфераза
БАВ	Биологически активные вещества
БАД	Биологически активная добавка
БАСК	Бактерицидная активность сыворотки крови
БЭВ	Безазотистые экстрактивные вещества
ВЭ	Валовая энергия
ГОСТ	Государственный стандарт
КК	Комбикорм-концентрат
ЛАСК	Лизоцимная активность сыворотки крови
ЛПУ	Легкопереваримые углеводы
МД	Массовая доля
НД	Нормативная документация
ОВ	Общая влага
ОР	Основной рацион
ОФР	Опсоно-фагоцитарная реакция
ОЭ	Обменная энергия
ПЗА	Полный зоотехнический анализ
ПП	Переваримый протеин
С/Х	Сельскохозяйственный
СВ	Сухое вещество
СЖ	Сырой жир
СЗ	Сырая зола
СК	Сырая клетчатка
СОМО	Сухой обезжиренный молочный остаток
СП	Сырой протеин
ТУ	Технические условия
ФА	Фагоцитарная активность
ФИ	Фагоцитарный индекс
ФЧ	Фагоцитарное число
ЭКЕ	Энергетическая кормовая единица

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Обоснование исследований.....	6
2.	Цель и задачи исследований.....	9
3.	Материал и методика исследований.....	10
4.	Результаты исследований.....	15
4.1.	Анализ рациона кормления подопытных животных.....	15
4.2.	Молочная продуктивность и качество молока коров в период опыта.....	19
4.3.	Расчет затрат кормов.....	21
4.4.	Гематологические показатели крови, иммунитет.....	21
4.5.	Микрофлора содержимого толстого кишечника.....	27
4.6.	Экономическая эффективность.....	28
5.	Выводы.....	30
6.	Предложения производству	32
	Список использованной литературы.....	33

1. Обоснование исследований

Снабжение населения России продуктами животноводства – одна из важнейших проблем, которую необходимо решить агропромышленному комплексу в короткое время.

Данную проблему можно решить за счет применения прогрессивных технологий, более полного использования генетического потенциала молочной и мясной продуктивности, создания оптимальных условий содержания животных и организации полноценного кормления. В этой связи изыскание современных технологий кормления, предусматривающих использование более дешевых кормов, является актуальным и имеет важное народнохозяйственное значение (Е.А. Ажмулдинов и др., 2006; В.И. Левахин и др., 2005; И.Ф. Горлов и др., 2015).

В настоящее время важнейшей задачей является увеличение производства высококачественной животноводческой продукции. Для ее решения следует задействовать все резервы (А.М. Запруднов и др., 2001).

С этой целью перспективно применять различные кормовые добавки, балансирующие рационы по биологически активным веществам (В.И. Левахин и др., 2005; Х.Х. Тагиров и др., 2012).

В связи с этим в последние годы все больше внимания уделяется изучению и производству биологически активных кормовых добавок, направленных на стимуляцию неспецифического иммунитета, профилактику и лечение смешанных желудочно-кишечных инфекций и расстройств пищеварения, вызванных нарушением микробиоценоза пищеварительного тракта (Б.В. Тараканов и др., 2000; Н.А. Ушакова и др., 2003; П.А. Красочки, 2009; Н.А. Ушакова и др., 2009; Н.А. Ушакова и др., 2010; FAO, 2006; M. deVreese et al., 2008; K.A. Abbas et al., 2009; G.M. Chu et al., 2011).

Большой вклад в изучение эффективности использования пробиотических препаратов при выращивании домашних животных внесли отечественные ученые, которые изучали влияние пробиотиков на рост и развитие, про-

цессы пищеварения и обмена веществ, неспецифические факторы защиты организма (А.Н. Панин и др., 1993; Б.В. Тараканов, 2000; Н.И. Малик, А.Н. Панин, 2001; Н.В. Данилевская, Р.С. Кудинкин, 2005).

При разработке кормовых пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков, следует определять режим их применения: оптимальную дозу включения в рацион, рациональную продолжительность использования, а также эффективность их применения (Р.Р. Гадиев и др., 2008; Т.А. Курзюкова, Н.А. Крамаренко, 2012; А.А. Валитова и др., 2014).

Пробиотики относятся к числу кормовых добавок, в наибольшей степени отвечающих особенностям пищеварительной системы жвачных животных. В целом – это живая микробная кормовая добавка, которая оказывает полезное действие на животного-хозяина путем улучшения его кишечного микробного баланса. (Б.В. Тараканов и др., 2003; G.W. Tannock, 2005; О.Г. Башкиров, 2003; Г.Ю. Лаптев и др., 2004; В.Г. Двалишвили и др., 2008; А.Н. Панин, Н.И. Малик, 2009; Р.В. Некрасов и др., 2010, R.Fuller, 1992)

Применение пробиотиков связано с решением различных проблем со здоровьем, повышением эффективности пищеварения, стимуляцией роста и развития. Установлено, что применение пробиотиков может оказывать противоинфекционное, иммуномодуляторное воздействие на организм животного, повышать барьерные функции (физиологические механизмы, защищающие организм от воздействия окружающей среды, препятствующие проникновению в него бактерий, вирусов и вредных веществ), стимулировать моторику и экскреторную функции кишечника, регулировать его микробный гомеостаз, выделять бактериоцины (R. Walker, M. Buckley, 2006; M. Vrese et al., 2007; S.K. Mazmanian et al., 2008; J.K. Seo et al., 2010; L. Morelli et al., 2012).

Самыми распространенными в ветеринарной медицине являются пробиотические препараты на основе бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки (Лактоамиловарин, Энзимспорин). Особое внимание уделяется спорообразующим бактериям-антагонистам (А.М. Запруднов, Л.Н. Мазанко-

ва, 2001; Н.И. Малик, А.Н. Панин, 2001; Н.В. Данилевская, Р.С. Кудинкин, 2005; В.Д. Похilenко, В.В. Перелыгин, 2007).

Споры *Bacillus* обладают жизнестойкостью даже при высоких температурах (Н.В. Ананьева и др., 2007; В.И. Байбаков и др., 2007; П.А. Красочки, 2009; С.В. Копыльцов, 2011; Л.В. Устюжанинова и др., 2012; A.T.Bull, 1984; O.Simon et al., 2001; A. Mortazavian et al., 2007; K. ElZahar et al., 2012).

Широко применяемые микроорганизмы в качестве пробиотиков относятся к роду рода *Bacillus* и представлены *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*. Данные бактерии не являются элементами нормофлоры в микробных сообществах и животных, но обладают свойствами, которые обеспечивают организму возможность поддерживать состояние микрофлоры на уровне экологически естественного. Они оптимизируют обмен веществ и улучшают снабжение организма биологически активными и строительными веществами, обеспечивают качественное переваривание пищи, оказывают антигистаминное и антитоксическое действие, существенно повышая неспецифическую резистентность организма. Существуют данные подтверждающие положительное действие бациллярных препаратов на поросятах и телятах (Л.Г. Войчишина, 1991; П.И. Жданов, 1994; Д.А. Девришов, 1996; Л.Ф. Бакулина, 2001).

В связи с этим испытания различных дозировок спорового пробиотика Энзимспорин интересно как с научной точки зрения, так и представляет практическое значение для условий Вологодской области и Российской Федерации в целом.

2. Цель и задачи исследований

Цель исследований – провести испытания по определению эффективности использования в кормлении коров различных дозировок пробиотика Энзимспорин на основе спорообразующих бактерий.

Для достижения поставленной цели изучались следующие вопросы:

- анализ рационов кормления подопытных животных;
- молочная продуктивность и качество молока коров;
- биохимические показатели крови подопытных животных;
- показатели неспецифического иммунитета животных;
- микробиологические показатели содержимого толстого кишечника коров;
- расчет возможного экономического эффекта при скармливании изучаемой пробиотической добавки в рационах дойных коров.

3. Материал и методика исследований

Для реализации поставленных задач на базе СПК «Агрофирма Красная Звезда» Вологодского района Вологодской области, а также в лаборатории БУВВО «Вологодской облветлаборатории» г. Вологда, в лабораториях ВИЖ им. Л.К. Эрнста Подольского района Московской области были проведены исследования, включая научно-хозяйственный опыт по следующей схеме:

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта

Группа животных	Количество животных	Характеристика кормления
Коровы		
1-контрольная	12	Основной рацион
2-опытная	12	ОР + пробиотик 12 г/гол./сут.

Для научно-хозяйственного опыта были подобраны две группы коров айрширской породы в начале лактации, по 12 голов в каждой. Исследования проведены в период с 12 августа по 26 ноября 2016 года. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 106 дней. Коровам 1-ой контрольной группы скармливались корма по рациону кормления, принятому в хозяйстве. 2-ая опытная группа получала изучаемый пробиотический препарат в смеси с концентратной частью рациона ежедневно в утреннее кормление суточную дозу в количестве 12,0 г/гол. в сутки, соответственно.

Животные контрольной и опытных групп были размещены в одном помещении, где им были созданы одинаковые условия кормления и содержания (А.П. Калашников и др., 2003).

Свойства *Bacillus subtilis* и *Bacillus licheniformis* широко известны и представляют собой взаимодополняющую комбинацию микроорганизмов.

Bacillus subtilis (сенная палочка), благодаря продуцируемым антибиотикам и способности закислять среду обитания, является антагонистом патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла, протей, стафилококки, стрептококки, дрожжевые грибки; продуцирует фер-

менты, удаляющие продукты гнилостного распада тканей, восстанавливается численность популяций лакто- и бифидобактерий, кишечной палочки и других микроорганизмов, составляющих нормофлору желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и обеспечивающих его нормальное функционирование; синтезирует аминокислоты, витамины и иммуноактивные факторы.

Bacillus licheniformis продуцирует ряд биологически активных белков, пептидов, ферментов и витаминов, способствует выработке организмом интерферона, которые уничтожают патогенные микробы и вирусы, приводя к нормализации микрофлоры кишечника, способствуют перевариванию пищи, снимают пищевые и химические отравления, уничтожают поврежденные и раковые клетки (<http://agropost.ru/skotovodstvo/kormlenie-krs/vliyanie-bioplyus2b-na-produktivnost-krs.html>).

Изучаемый препарат включает следующие штаммы микроорганизмов:

1. *Bacillus subtilis* ВКМ В-2998D (ВКПМ В-314) является антагонистом патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла, протей, стафилококки, стрептококки, дрожжевые грибки; продуцирует ферменты, удаляющие продукты гнилостного распада тканей, восстанавливается численность популяций лакто- и бифидобактерий, кишечной палочки и других микроорганизмов, составляющих нормофлору желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и обеспечивающих его нормальное функционирование; синтезирует аминокислоты, витамины и иммуноактивные вещества, обладает повышенной термостабильностью.

2. *Bacillus licheniformis* ВКМ В-2999D (ВКПМ В-8054) продуцирует ряд белков, пептидов, ферментов и витаминов, способствует выработке организмом интерферона, которые уничтожают патогенные микробы и вирусы, приводя к нормализации микрофлоры кишечника, способствуют перевариванию пищи, снимают пищевые и химические отравления.

3. *Bacillus subtilis* ВКМ В-3057D (ВКПМ В-12079) является продуцентом антибиотических веществ и дополнительно продуцирует целлобиазу

и эндо 1,4 бета-глюканазу, что позволяет расширить спектр антагонистической активности целевого пробиотика.

Для повышения эффективности пробиотического препарата в его состав включен комплекс ферментов, включая ксиланазу, β -глюканазу, целлюлазу, а также вспомогательные вещества – натрий хлористый и лактозу.

Важными свойствами нового пробиотического комплекса являются:

- широкий спектр действия по отношению к патогенным бактериям;
- термостабильность;
- высокое качество при хранении;
- экологическая безопасность;
- удобство в применении (как в составе комбикорма, так и при выпойке молоком, в составе заменителей).

В период научных исследований изучены рационы кормления подопытных животных на соответствие их современным требованиям потребностей в питательных веществах и энергии. Рассчитаны затраты кормов – путем определения расхода кормов на единицу полученной продукции.

Корма для химического анализа отбирали согласно ГОСТ Р ИСО 6497-2011.

Химический состав кормов определен в испытательной лаборатории БУВВО «Вологодская областная ветеринарная лаборатория» (лицензия № 77.99.18. 001 Л 000094.06.11 от 23.06.2011 г.): влажность, МД сырого протеина (ГОСТ 32044 1-2012), МД сырой клетчатки (ГОСТ 31675-2012), МД сырого жира (ГОСТ 13496.15-97), МД сырой золы (ГОСТ 32933-2014), МД кальция (ГОСТ 26570-95), МД фосфора (ГОСТ 26657-97).

Расчет рационов кормления проводился посредством программного комплекса КормОптимАЭксперт (Версия 2016, ООО «Кормресурс»).

Удой (валовой, среднесуточный) рассчитан на основе проводимых контрольных доек в начале эксперимента и далее ежемесячно от всех подопытных животных ($n=12$).

Пробы молока для анализа отбирали в соответствии с ГОСТ 26809-86.

Для определения качества молока подопытных животных ($n=12$) отбирались средние пробы молока и в испытательной лаборатории БУВВО «Вологодская областная ветеринарная лаборатория» были определены: МД жира (жиромер, по ГОСТ 5867-90), МД белка (по ГОСТ 23327-98), содержание соматических клеток (по ГОСТ 23453-2014).

В конце опыта был произведен забор крови у подопытных животных из хвостовой вены, по 3 головы из каждой группы. Проведен ее гематологический анализ в лаборатории биохимических исследований ВИЖ им. Л.К. Эрнста на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell (AwarenessTehnology, США). Биохимические исследование сыворотки крови с определением: аланинглутамат-трансферазы (АЛТ) – УФ-кинетическим методом; аспартатаминотрансферазы (АСТ) – УФ-кинетическим методом; щелочной фосфатазы – кинетическим методом; общего белка – биуретовым методом; альбумина – колориметрическим методом; креатинина – кинетическим методом Яффе; мочевины – ферментативным колориметрическим методом по Бертелоту; билирубина – количественное определение методом Walters и Gerarde. В лаборатории микробиологии ВИЖ им. Л.К. Эрнста в крови были определены показатели неспецифической резистентности подопытных животных (И.И. Архангельский, 1976; В.С. Григорьев, В.И. Максимов, 2007). Бактерицидная активность определена фотонефелометрическим методом, основанным на учете изменения оптической плотности среды, содержащей микробную взвесь и сыворотку крови в течение времени. Для оценки лизоцимной активности (ЛА) использовали метод В.И. Мутовина, основанный на измерении зон лизиса вокруг сыворотки крови, внесенной в лунки зараженного МПА. Фагоцитарная активность клеток крови оценивалась, прежде всего, определением поглощающей и переваривающей способности клеток крови. О фагоцитарной способности лейкоцитов крови судили по данным их фагоцитарной активности, показателям общей фагоцитарной емкости, фагоцитарного числа и индекса, а также показателю завершенного фагоцитоза.

Изучался микробиологический профиль содержимого экскрементов

подопытных животных, для чего отбирались их пробы от подопытных животных ($n=3$). В лаборатории микробиологических исследований ВИЖа проводили их анализ методом высеяния десятикратных разведений на питательные и дифференциально-диагностические среды, с последующим подсчетом количества (КОЕ/г) по группам микроорганизмов: лактобактерии, бифидобактерии, кишечная палочка (лактозоположительная, лактозоотрицательная), стафилококки.

Исходя из анализа рациона кормления, стоимости кормов и полученного удоя за период опыта рассчитан возможный экономический эффект от использования изучаемого пробиотического препарата в кормлении дойных коров в начале лактации.

Полученные в опыте материалы обработаны биометрически с использованием t -критерия Стьюдента. При этом вычислены следующие величины: среднеарифметическая (M), среднеквадратическая ошибка ($\pm m$) и уровень значимости (p). Результаты исследований считали высокодостоверными при $p < 0,001$ и достоверными при $p < 0,01$ и $p < 0,05$. При $p < 0,1$, но $p > 0,05$ - тенденция к достоверности полученных данных. При $p > 0,1$ разницу считали недостоверной.

4. Результаты исследований

4.1. Анализ рациона кормления подопытных животных

Как было указано ранее, животные контрольной и опытных групп находились в одинаковых условиях содержания. Кормление их осуществлялось по распорядку дня, принятому в хозяйстве.

При проведении научно-хозяйственного опыта животные подопытных групп получали хозяйственный рацион, состоящий из силоса, сена, концентратов, минеральных добавок.

Рационы кормления животных составлены в соответствии с их живой массой и продуктивностью (табл. 2).

Таблица 2 – Кормовые рационы подопытных коров

Корма и показатели	Группа		% в СВ
	1-контрольная	2-опытная	
Комбикорм, кг	13,500	13,500	
Свекловичная патока (меласса), кг	1,000	1,000	
Силос (злаково-бобовый), кг	35,000	35,000	
Сено разнотравное, кг	1,000	1,000	
Соль поваренная, кг	0,100	0,100	
Мел кормовой, кг	0,05	0,05	
Пробиотик, г	-	+	
В рационе содержится:			
обменной энергии, МДж	247,0	247,0	11,4
сухого вещества, кг	21,7	21,7	-
сырого протеина, г	3850,1	3850,1	17,74
переваримого протеина, г	2337,1	2337,1	10,77
сырого жира, г	992,8	992,8	4,58
сырой клетчатки, г	3185,5	3185,5	14,68
крахмала, г	3514,8	3514,8	16,2
сахара, г	708,0	708,0	3,26
кальция, г	169,4	169,4	0,78
фосфора, г	98,0	98,0	0,45

Корма и показатели	Группа		% в СВ
	1-контрольная	2-опытная	
Mg, г	15,6	15,6	0,07
S, г	14,3	14,3	0,07
K, г	238,0	238,0	1,1
NaCl, г	104,9	104,9	0,48
каротина, мг	675,1	675,1	-
витамина D, тыс.МЕ/кг	4,3	4,3	-
витамина Е, мг/кг	701,41	701,41	-
Fe, мг/кг	2640,0	2640,0	-
Cu, мг/кг	46,0	46,0	-
Zn, мг/кг	170,5	170,5	-
Mn, мг/кг	2979,8	2979,8	-
Co, мг/кг	0,2	0,2	-
I, мг/кг	3,4	3,4	-

+ - 12 г/гол./сут.

При скармливании кормов по запланированным кормовым рационам в целом не была выявлена существенная разница в поедаемости объемистой части скармливаемого рациона. Суточную норму концентрированных кормов животные подопытных групп поедали без остатка.

Среднесуточные рационы новотельных коров подопытных групп были практически одинаковыми. Общая питательность его составила 24,7 энергетических кормовых единиц и 2337,1 г переваримого протеина, что соответствует уровню продуктивности коров 32-36 кг молока.

По рекомендациям ученых ВИЖа концентрация обменной энергии (КОЭ) в сухом веществе рациона для высокопродуктивных коров должна составлять не менее 10,2 МДж/кг (а при уровне продуктивности свыше 6000 кг молока за лактацию не менее 10,8 МДж ОЭ), в нашем опыте этот показатель полноценности кормления составлял 11,4 МДж при количестве СВ – 21,7 кг/гол./сут., что указывает на высокую сбалансированность рациона кормления и качество используемых кормов.

Известно также, что молочная продуктивность во многом зависит от количества и качества протеина в рационе. Для коров с массой тела 550 – 650 кг и продуктивностью 25 кг молока в сутки концентрация сырого протеина в сухом веществе должна находиться в пределах 13,4 – 14,4% (а при уровне продуктивности свыше 6000 кг молока за лактацию не менее 16%). В наших исследованиях концентрация сырого протеина в сухом веществе рациона составляла 17,74%, что является весьма высоким показателем и позволяет обеспечить достаточный уровень раздоя новотельных коров.

Другим показателем, характеризующим полноценность протеинового питания коров, является концентрация переваримого протеина на 1 ЭКЕ. Для высокопродуктивных коров этот показатель должен превышать 91-95 г. В нашем опыте содержание переваримого протеина на 1 ЭКЕ составило 94,6 г, что подтверждает сбалансированность кормления животных подопытных групп.

Оптимальное количество жира в рационах коров с продуктивностью 20 – 25 кг молока в сутки должно составлять 30-32 г на 1 кормовую единицу. В нашем опыте этот показатель составлял 40,2 г на кормовую единицу.

Легкопереваримые углеводы имеют большое значение в регулировании обмена веществ и энергии в организме. Многие ученые считают, что их недостаток в рационе приводит к нарушениям углеводно-жирового обмена, ацидозу, накоплению кетоновых тел, снижению щелочного резерва крови (А.П. Калашников, В.И. Фисинин и др., 2003). Эти исследователи рекомендуют при кормлении лактирующих коров с удоем 4000 кг молока в год и ниже составлять рацион, так, чтобы сахаро-протеиновое отношение равнялось 0,8-1,2, а при кормлении коров с годовым удоем 5000-6000 кг молока и выше – 1,2-1,5. В приведенном рационе сахаропротеиновое отношение составило 0,30. Следует обратить внимание и на сумму ЛПУ в рационе. Их доля в рационе новотельных коров должна быть на уровне 26-28% в СВ рациона.

Одним из показателей, влияющих на эффективность использования энергии, служит уровень клетчатки в кормовом рационе. По данным А.П.

Калашникова, В.И. Фисинина и др. (2003) клетчатка в оптимальных количествах (15-22% от сухого вещества рациона) необходима молочному скоту для течения нормальных физиологических процессов в рубце. В опыте, проведенном на лактирующих коровах, содержание сырой клетчатки в процентах от сухого вещества составило 14,7%, что в целом немного ниже допустимой нормы. Возможно следует несколько увеличить долю объемистых кормов в структуре рациона кормления (в анализируемом рационе доля концентратов около 60%).

В питании высокопродуктивных лактирующих коров значение кальция и фосфора чрезвычайно велико. Они участвуют во всех процессах обмена веществ, происходящих в организме. По данным А.П. Калашникова, В.И. Фисинина и др. (2003) при годовом удое 7000-8000 кг молока и живой массе коров 500 – 600 кг содержания кальция и фосфора должно быть соответственно 127-127,3 и 104,8-105,1 г, при том, что в анализируемом рационе содержится 169,4 г кальция и 98,0 г фосфора.

Таким образом, необходимо отметить, в кормовых рационах лактирующих коров живой массой 600-650 кг с удоем 30-35 кг молока подопытных групп в целом оптимальное содержание сухого вещества при высокой концентрации в нем энергии и протеина, при в целом оптимальном уровне сырой клетчатки, что удовлетворяет требованиям современных детализированных норм кормления для высокопродуктивных животных в период раздоя. Сбалансированное кормление животных в период раздоя приводит к повышению продуктивности за счет улучшения переваримости и усвоемости питательных веществ кормов, конверсии корма при снижении себестоимости получаемой продукции. Это необходимо учесть при интерпретации полученных в наших исследованиях данных. Мы считаем, что среднесуточное потребление кормов удовлетворяло потребность коров в необходимом количестве энергии, переваримого протеина и минеральных веществ, что в целом обеспечило планируемую молочную продуктивность.

С целью изучения влияния пробиотика в дозировке 12,0 г/гол./сутки в составе рационов на молочную продуктивность, нами по каждой подопытной группе коров велся учет молочной продуктивности.

Как видно из данных таблицы 3, скармливание коровам 2-ой опытной группы в составе рациона пробиотика обеспечило удержание и некоторое повышение молочной продуктивности за период проводимого опыта (за 106 дней опыта).

Среднесуточный удой молока натуральной жирности и после перевода на 3,4% жирность у коров 2-ой опытной группы, был выше на 1,30 и 5,78 кг или на 4,66 и 8,67% в сравнении с животными контрольной группы, хотя эта разница между группами коров была статистически недостоверной.

Таблица 3 - Молочная продуктивность подопытных животных, качество молока (n=12, M±m)

Показатель	Группа	
	1 - контрольная	2 - опытная
Дней опыта	106	106
Среднесуточный удой молока натуральной жирности, кг	27,87±1,97 ^a	29,17±1,47 ^e
Валовой удой за период опыта, кг	2954,39±209,13	3092,15±155,78
Содержание % жира	3,91±0,09	4,05±0,14
Содержание белка, %	3,24±0,05	3,13±0,04
Валовой удой 3,4%-го молока за период опыта, кг	3393,41±246,43	3687,53±230,21
Среднесуточный удой молока 3,4%-й жирности, кг	32,01±2,32	34,79±2,17
% к контролю	100,00	108,67
Продукция молочного жира за период опыта, кг	115,52	125,23
Продукция молочного белка за период опыта, кг	95,74	96,78

Достоверно при *- p<0,05.

^a выбыло 1 животное, ^e выбыло 1 животное

В среднем за период опыта у животных 2-ой опытной группы наблюдается увеличение содержания жира на 0,14% при снижении содержания белка на 0,11% по сравнению с 1-ой контрольной группой.

Несмотря на это, за период опыта в связи с более высокой молочной продуктивностью у животных 2-ой опытной группы была выше продукция как молочного жира, так и продукция молочного белка – на 9,71 и 1,04 кг, соответственно.

Анализ лактационных кривых подопытных животных в период проведения эксперимента свидетельствует о том, что произошло повышение его уровня у животных опытной группы при увеличении жирномолочности коров (рис. 1).




Рисунок 1. Лактационные кривые коров в период проведения испытаний

4.3. Расчет затрат кормов

Одним из основных показателей, характеризующих эффективность отрасли животноводства являются затраты кормов на единицу продукции (табл. 4).

Таблица 4 – Затраты питательных веществ и энергии на 1кг молока 3,4%-ной жирности (в среднем на голову)

Показатель	Группа	
	1-контрольная	2-опытная
Обменной энергии, ЭКЕ	0,77	0,65
Сухого вещества, г	677,91	574,23
Переваримого протеина, г	73,01	61,84

Расчет затрат посредством наложения имеющегося фактического рациона кормления на полученную продукцию, показал, что включение в рационы лактирующих коров 2-ой опытной группы пробиотического препарата в количестве 12 г/гол. в сутки, положительно повлияло на снижение затрат энергетических кормовых единиц, сухого вещества, переваримого протеина на единицу производимой продукции. Значения перечисленных показателей снизились в опытной группе на 15,6%; 15,3%; 15,3% по сравнению с животными контрольной группы.

Таким образом, включение в рацион высокопродуктивных молочных коров пробиотического препарата в количестве 12 г/гол. в сутки, может способствовать сокращению затрат питательных веществ на производство 1 кг молока 3,4% жирности.

4.4. Гематологические показатели крови, иммунитет

Отражением обмена веществ является внутренняя среда организма. Кровь осуществляет стабилизацию (гомеостаз) внутренней среды, что необходимо для жизнедеятельности клеток и тканей, обеспечивает функциональное единство организма (В.И. Георгиевский, 1990).

Особо важное значение имеют уровень естественной резистентности организма животных, их адаптационные способности. Известно, что кровь, являясь внутренней средой организма и связывая все системы и органы в единое целое, служит индикатором происходящих внутри него процессов (В.И. Котарев, Е.А. Дуванова, 2008). В связи с этим нами были определены некоторые гематологические показатели, а также факторы естественной резистентности животных в сравнении с контролем.

Таблица 5 - Биохимические и гематологические показатели крови подопытных животных в начале эксперимента ($M \pm m$, n=3)

Показатель	Группа	
	1-контрольная	2-опытная
Белок общий, г/л	94,01±5,74	91,54±0,37
Альбумины, г/л	34,88±2,68	31,78±0,46
Глобулины, г/л	59,13±3,38	59,76±0,42
А/Г отношение	0,59±0,03	0,53±0,01
Холестерин общий, ммоль/л	7,18±0,04	7,67±0,67
Креатинин, мкмоль/л	46,19±9,70	38,71±2,47
Мочевина, ммоль/л	8,15±0,61	6,62±0,47
Билирубин общий, мкмоль/л	36,62±30,56	11,59±0,64
АЛТ, МЕ/л	55,11±22,11	35,49±2,28
АСТ, МЕ/л	385,29±296,59	105,17±26,45
Щелочная фосфатаза, МЕ/л	75,05±17,97	71,01±30,98
Глюкоза, ммоль/л	1,87±0,27	1,85±0,19
Кальций, ммоль/л	2,54±0,04	2,66±0,09
Фосфор, ммоль/л	2,92±0,66	1,80±0,07
Са/Р отношение	1,09±0,21	1,69±0,01
Лейкоциты, $10^9/\text{л}$	8,27±0,05	8,22±0,29
Эритроциты, $10^{12}/\text{л}$	13,16±1,95	9,62±0,74
Гемоглобин, г/л	99,25±2,41	104,90±3,35
Гематокрит, %	39,59±1,42	41,87±1,04

Достоверно при *- $p < 0,05$.

Анализируя результаты биохимических исследований необходимо отметить, что все полученные показатели находились в пределах физиологиче-

ской нормы, что свидетельствует о том, что эксперимент был проведен на клинически здоровых животных (табл. 5).

Соответствие уровня белкового питания биологическим потребностям организма коров проводится по концентрации общего белка и его фракций в сыворотке крови, белковому индексу, содержанию мочевины. Необходимо учесть, что по уровню общего белка нельзя оценить уровень питания, так как этот показатель может изменяться под воздействием многих факторов, не относящихся непосредственно к протеиновому питанию, но характерных для некоторых нарушений обмена веществ и функции печени. В связи с этим, чтобы исключить влияние фактора здоровья на объективность показателей сбалансированного протеинового питания коров, вводятся дополнительные диагностические тесты на активность фермента аспартатаминотрансферазы, которая указывает на функциональное состояние одного из важнейших органов, участвующего во всех сторонах обмена веществ и, в частности, в белковом, - печени (В.В. Казарцев, А.Н. Ротошный, 1986).

Результаты исследования отобранных проб крови показали, что содержание общего белка у подопытных исследованных животных в период проведения научно-хозяйственного опыта составило 91,54 против 94,01 г/л в контроле, или ниже на 2,6%. Как мы видели рацион животных содержал большое количество белка при низком уровне ЛПУ в рационе кормления, поэтому снижение белка (72-86 г/л) в крови животных опытной группы при скармливании пробиотика очень важно, так как это означает снижение нагрузок на печень. Об этом свидетельствуют уровни в сыворотке крови мочевины, АЛТ, АСТ, билирубина, которые снизились на 18,8; 35,6; 72,7 и 68,4%! То есть практически стабилизировались на физиологически адекватном уровне. При этом процентное содержание в сыворотке крови белковой фракции альбумина у коров 2-ой опытных группы оказалось ниже контроля на 8,9%. Об интенсивности биосинтетических процессов в организме животных обычно судят по белковому индексу (А/Г коэффициенту). Белковый ин-

декс у коров опытной группы, получавших пробиотик, впрочем, как и у контрольных, был несколько ниже физиологической нормы (0,6-1,0).

Содержание холестерина в крови здоровых коров находится в прямой корреляции с молочной продуктивностью животных. Так как наивысший среднесуточный удой отмечается у коров 2-ой опытной группы, то и содержание холестерина у данной группы превышает контроль на 0,49 ммоль/г соответственно.

Соотношение кальция и фосфора в крови животных опытной группы находилось в пределах физиологической нормы, тогда как у коров контрольной группы было существенно ниже – на 0,6 ед.

Из морфологических показателей в цельной крови животного чаще всего определяют эритроциты, лейкоциты, гемоглобин и др.

Физиологическое значение данных элементов крови очень большое. Основную часть плотного остатка крови составляют эритроциты, синтез которых осуществляется в красном костном мозге. Эритроциты не содержат ядра и выполняют роль переносчиков кислорода. Величина эритроцитов колеблется в зависимости от функционального состояния костного мозга, осмотической концентрации крови, вида животного и возраста клеток. В крови млекопитающих число эритроцитов в норме составляет $5\text{-}9 \times 10^{12}/\text{л}$. В наших исследованиях содержание эритроцитов в крови животных 2-ой опытной группы стабилизировалось по сравнению с контролем в пределах нормы, тогда как в контроле превышало нормативные показатели. Важнейшая функция эритроцитов состоит в транспортировке кислорода из легких в ткани и углекислоты в обратном направлении. При этом первостепенная роль принадлежит гемоглобину как уникальному транспортному белку. Содержание гемоглобина в крови коров 2-ой опытной группы было выше контроля на 5,65 г/л. Насыщенность эритроцитов гемоглобином свидетельствует о повышении окислительно-восстановительных процессов в тканях организма коров, получавших исследуемую дозу пробиотика. Эритроциты пассивно адсорбируют большое количество антигенов, попадающих в организм, таких как бактерии-

альные полисахариды, пенициллин и др. Этим в определенной степени предотвращается массивное поступление антигенов в органы иммуногенеза. Следовательно, эритроциты являются своеобразной буферной системой, регулирующей активность иммунного ответа.

Лейкоциты в организме животного выполняют защитную функцию, то есть формируют в организме клеточный иммунитет, а по отдельным форменным элементам можно судить об остром и хроническом течении инфекционного процесса, паразитарном характере поражения организма-хозяина и характеризовать многие другие физиологические процессы. Лейкоциты свободно мигрируют из сосудов в ткани, выявляя и уничтожая в них чужеродные белоксодержащие образования (вирусы, бактерии и др.), а также поврежденные клетки собственных тканей.

Уровень лейкоцитов оказался у дойных коров контрольной и 2-ой опытной группы на уровне $8,22-8,27 \times 10^9/\text{л}$, то есть фактически не имел различий.

Таким образом, гематологические показатели крови коров опытной группы, получавших пробиотический препарат Энзимспорин, свидетельствуют в целом о существенном улучшении анаболических процессов в их организме, что нашло своё подтверждение в повышении молочной продуктивности коров.

Резистентность организма — это устойчивость организма к действию различных болезнестворных факторов (физических, химических и биологических). Различают неспецифическую резистентность организма, то есть устойчивость организма к любым патогенным воздействиям, независимо от их природы, и специфическую, обычно к определенному агенту.

Состояние естественной резистентности организма наиболее полно характеризует бактерицидная активность сыворотки крови, которая заключается в способности подавлять рост микроорганизмов и зависит от активности всех гуморальных факторов неспецифической устойчивости.

Лизоцим по своей природе является ферментом (ацетилмурамидаза) и содержится почти во всех органах и тканях животных. Содержание его в сыворотке крови телят коррелирует с бактерицидной активностью. Лизоцим стимулирует фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов, синтез антител, а также способен разрушать липополизахаридные поверхностные слои клеточных стенок большинства бактерий. Снижение титра лизоцима или исчезновение его в крови приводит к возникновению инфекционной болезни. БАСК – комплексный показатель, включающий несколько факторов, в том числе лизоцим.

Как показывает анализ показателей неспецифической резистентности подопытных животных (табл. 6), у коров 2-ой опытной группы произошло увеличение бактерицидной активности сыворотки крови и уровня лизоцима на 1,63% и 0,08 мкг/мл сыворотки соответственно, что дополнительно характеризует эффект от использования пробиотика в данной группе животных.

Показатели естественной резистентности организма исследуются путем комплексной оценки также фагоцитарной активности микрофагов в периферической крови по таким показателям, как фагоцитарная активность (ФА), фагоцитарное число (ФЧ) и фагоцитарный индекс (ФИ).

Таблица 6 - Показатели неспецифической резистентности крови подопытных коров в середине опыта ($M \pm m$, n=3)

Показатель	Группа	
	1-контрольная	2-опытная
Белок общий, г/л	94,01±5,74	91,54±0,37
% лизиса	12,40±2,85	18,85±2,15
Лизоцим, мкг/мл сыворотки	0,37±0,04	0,45±0,03
уд.ед.а, ед.а/мг.белка	0,82±0,16	1,11±0,09
БАСК (Бактерицидная активность), %	53,66±1,41	55,29±0,81
ФА (Фагоцитарная активность), %	23,34±3,06	12,84±1,10
ФИ (Фагоцитарный индекс)	1,85±0,25	1,56±0,12
ФЧ (Фагоцитарное число)	0,42±0,03	0,20±0,01

Как показывает анализ показателей неспецифической резистентности (табл. 6), у коров опытных групп несколько снизились показатели фагоцитарной активности на 10,05%, 0,29 и 0,22 ед. по сравнению с контролем, что требует дополнительного изучения.

Таким образом, пробиотический препарат Энзимспорин повлиял в первую очередь на бактерицидную и лизоцимную активности сыворотки крови, тем самым стимулируя при этом иммунитет коров.

4.5. Микрофлора содержимого толстого кишечника

Важнейшим фактором, влияющим как на рост, так и на здоровье животного, является состояние микробиоценоза кишечника. Роль нормальной микрофлоры кишечника заключается в поддержании механизмов естественной резистентности за счет конкуренции с патогенами за рецепторы слизистой оболочки кишечника на стадии их первичной адгезии и колонизации. Под влиянием эуфлоры происходит активация системы комплемента и фагоцитоза, усиление выработки IgM и секреторного IgA, что играет важную роль в санации организма от возбудителей кишечной инфекции.

Таблица 7 - Микробиологические показатели кала подопытных животных
(n=3, M±m)

Группа	Лакто-бактерии, КОЕ/г	Бифидо-бактерии, КОЕ/мл	Кишечная палочка, КОЕ/г		Стафилококки, КОЕ/г
			Лактозо-положительная	Лактозо-отрицательная	
1 - контрольная	$5,7 \times 10^4$	$8,5 \times 10^5$	$1,51 \times 10^6$	$5,7 \times 10^3$	$1,0 \times 10^2$
2 - опытная	$3,13 \times 10^4$	$2,5 \times 10^5$	$3,4 \times 10^6$	$1,0 \times 10^3$	$1,0 \times 10^2$

Лабораторные данные показывают, что в содержимом толстого кишечника подопытных животных количество исследуемых микроорганизмов существенно не отличалось и находилось в целом в пределах нормы.

4.5. Экономическая эффективность

На основании данных по расходу кормов и валового удоя молока подопытных животных, была рассчитана экономическая эффективность использования разных дозировок изучаемого пробиотического препарата.

Анализируя данные таблицы 8, необходимо отметить, что стоимость кормов во всех группах дойных коров за весь период опыта составила 24062,00 рублей.

Таблица 8 - Экономическая эффективность использования пробиотика в научно-хозяйственном опыте на коровах (в расчете на 1 голову)

Показатель	Группа	
	1-контрольная	2-опытная
Получено молока 3,4-%-ной жирности	3393,41	3687,53
Цена реализации 1 кг молока 3,4-%-ной жирности, руб.	17,57	17,57
Сумма реализации молока, руб.	59622,21	64789,90
Стоимость кормов рациона за период опыта, руб.	24062,00	24062,00
Стоимость дополнительно скармливаемого пробиотического препарата, руб.	-	954,00
Стоимость рациона с пробиотиком, руб.	24062,00	25016,00
Дополнительный надой молока, кг	-	294,12
Стоимость дополнительно полученного молока, руб.	-	5167,69
Превышение стоимости полученного молока над стоимостью использованных кормов, руб.	35560,21	39773,90
Дополнительная прибыль за период опыта, руб.	-	4213,69
Дополнительная прибыль, руб./сут.	-	39,75

Кроме того, были расходы, направленные на приобретение пробиотического препарата, что увеличило расходы на корма на 954,00 руб. за период опыта во 2-ой опытной группе коров. Однако от коров 2-ой опытной группы надоено за период эксперимента на 294,12 кг больше молока 3,4%-ной жирности, чем от животных 1-ой контрольной группы. Следовательно, и сумма

от реализации молока была выше. Она превысила контроль на 5167,69 руб. на голову за период опыта.

Таким образом, использование пробиотика позволило увеличить эффективность производства молока, обеспечив дополнительный эффект в размере +4213,69 рублей на голову за период опыта.

5. Выводы

5.1. Скармливание изучаемого пробиотика в количестве 12 г/голову в сутки коровам обеспечило увеличение среднесуточных удоев 3,4%-ного молока на 5,78 кг или на 8,67%, при снижении затрат кормов на единицу получаемой продукции.

5.2. Включение в рацион лактирующих коров 2-ой-опытной группы пробиотического препарата привело к снижению затрат энергетических кормовых единиц, сухого вещества, переваримого протеина, соответственно на 15,6%; 15,3%; 15,3% по сравнению с животными контрольной группы.

5.3. В крови лактирующих коров 2-ой опытной группы отмечена тенденция к снижению уровня общего белка на 2,6%, при снижении в сыворотке крови мочевины, АЛТ, АСТ, билирубина на 18,8; 35,6; 72,7 и 68,4% в сравнении с контролем. Соотношение кальция и фосфора в крови животных опытной группы находилось в пределах физиологической нормы, тогда как у коров контрольной группы было существенно ниже – на 0,6 ед. Содержание эритроцитов в крови животных 2-ой опытной группы стабилизировалось по сравнению с контролем в пределах нормы, тогда как в контроле превышало нормативные показатели. Содержание гемоглобина в крови коров 2-ой опытной группы было выше контроля на 5,65 г/л. У коров 2-ой опытной группы произошло увеличение бактерицидной активности сыворотки крови и уровня лизоцима на 1,63% и 0,08 мкг/мл сыворотки соответственно. Как показывает анализ показателей неспецифической резистентности, у коров опытных групп несколько снизились показатели фагоцитарной активности на 10,05%, 0,29 и 0,22 ед. по сравнению с контролем, что требует дополнительного изучения.

5.4. Лабораторные данные показывают, что в содержимом толстого кишечника подопытных животных количество исследуемых микроорганизмов существенно не отличалось и находилось в целом в пределах нормы.

5.5. При использовании в рационах коров 2-ой опытной группы 12 г/гол в сутки изучаемого пробиотика дополнительная прибыль составила +4213,69 рублей на голову за период опыта.

6. Предложения производству

Рекомендуем СПК «Агрофирма Красная Звезда» Вологодского района Вологодской области для рентабельного ведения молочного скотоводства укреплять кормовую базу.

Крупным специализированным и фермерским хозяйствам Вологодской области продолжить исследования в аспекте практического использования в кормлении дойных коров пробиотических препаратов, содержащих комплекс спорообразующих бактерий *Bacillus subtilis* и *Bacillus licheniformis*.

На основании полученных результатов исследований, проведенных в СПК «Агрофирма Красная Звезда» Вологодского района Вологодской области и других предприятиях страны, рекомендуем для повышения молочной продуктивности животных использовать пробиотик Энзимспорин при экономической целесообразности использования БАВ.

Список использованной литературы

1. Abbas K.A. The synergistic effects of probiotic microorganisms on the microbial production of butyrate in vitro / K.A. Abbas, D.L. Clemans // McNair Scholas Research Journal: Vol. 2: Iss. 1, Article 8.
2. Chu G.M. Efficacy of probiotics from anaerobic microflora with prebiotics on growth performance and noxious gas emission in growing pigs / G.M. Chu, S.J. Lee, H.S. Jeong, S.S. Lee // Animal Science Journal. 2011. Vol. 82 (2): 282-290.
3. FullerRay (Ed.) Probiotics. The scientific basis. Chapman & Hall. London. N.Y. Tokyo. —1992. —397 p.
4. Mazmanian S.K., Round J.L., Kaspe, D., 2008. A microbial symbiosis factor prevents inflammatory disease. *Nature*, 453, 620-625.
5. Morelli L, Capurso L., 2012.- FAO/WHO guidelines on probiotics: 10 years later. *J ClinGastroenterol*, 46 (suppl):1-2.
6. Tannock, G.W. Probiotics and prebiotics: scientific aspects, Ed. Caister-AcademicPress, Wymondham, UK, 2005. 230 pp
7. Walker R., Buckley M., 2006. Probiotic microbes: the scientific basis / A report from the American Academy of Microbiology, 22p.
8. Ажмулдинов, Е.А. Эффективность производства говядины в зависимости от технологии содержания животных / Е.А. Ажмулдинов, М.Г. Титов, А.Г. Ирсултанов, В.В. Попов, Н.Ф. Белова // Вестник мясного скотоводства. – 2006. – Т. 1. - №59. – С. 12-17.
9. Ананьева, Н.В. Влияние экзополисахаридов на стрессоустойчивость пробиотических культур / Н.В. Ананьева, В.И. Ганина // Материалы Международного конгресса «Пробиотики, пребиотики, синбиотики и функциональные продукты питания. Фундаментальные и клинические аспекты» (Санкт-Петербург, 15-16 мая 2007 года). – 2007. – С. 20.
10. Байбаков, В.И. Новый кислотоустойчивый штамм *B. Bifidum* 791 БАГ как основа БАД и заквасок / В.И. Байбаков, А.В. Молокеев, Т.Л. Карих // Материалы Международного конгресса «Пробиотики, пребиотики, синбиотики и функциональные продукты питания. Фундаментальные и клинические аспекты» (Санкт-Петербург, 15-16 мая 2007 года). – 2007. – С. 21.
11. Валитова, А.А. Эффективность использования пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» при производстве молока / А.А. Валитова, И.В. Миронова, М.М. Исламова // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2014. – №1 (29). – С. 45-50.
12. Войчишина, Л.Г. Применение спорообразующих бактерий в лечении больных дисбактериозом / Л.Г. Войчишина, В.Я. Чаплинский, В.А. Вьюницкая // Врачебное дело. – 1991. – № 6. – С. 73–75.
13. Гадиев, Р.Р. Использование нетрадиционных кормов и добавок в птицеводстве / Р.Р. Гадиев, Р.С. Юсупов, Д.Д. Хазиев.– М.: Лань. – 2008. – 204 с. 31. Галиев, Б.Х. Влияние полноценного кормления на продуктивность молодняка мясных / Б.Х. Галиев и др. // Зоотехния. – 1991. - №11. – С. 37-39.

14. Георгиевский, В.И. Физиология сельскохозяйственных животных.- Москва.- ВО «Агропромидат».-1990.-299 с.
15. Горлов И.Ф. Влияние скармливания кормовых многофункциональных добавок на интенсивность роста телочек / И.Ф. Горлов, В.А. Баранников, Н.А. Юрина, Н.Н. Есауленко, В.В. Ерохин // Молочное и мясное скотоводство. – 2015. – № 2. – С. 24-26.
16. Данилевская, Н.В. Влияние пробиотика лактобифадол на продуктивность поросят мясных пород на подсосе и доращивании / Н.В. Данилевская, Р.С. Кудинкин // Ветеринария и кормление. – 2005. – №3. – С. 16-17.
17. Двалишвили, В.Г. Целлобактрин–Т в рационах молодняка крупного рогатого скота /В.Г. Двалишвили, В.В. Пузанова, Я.Я. Киндсфатер// Зоотехния.-2008.-№7.- С.9-10.
18. Девришов, Д.А. Биоспорин как терапевтическое средство против желудочно-кишечных заболеваний поросят / Д.А. Девришов, Г.Н. Печникова, З.М. Бедоева // Новое в диагностике, лечении и профилактике болезней животных: Межвуз. сб. науч. тр.-М.: МГАВМиБ, 1996. – С. 15–19.
19. Жданов, П.И. Применение споробактеринажидкого поросятам / П.И. Жданов // Ветеринария.–1994. – № 7. – С. 41–44.
20. Запруднов, А.М. Микробная флора кишечника и пробиотики / А.М. Запруднов, Л.Н. Мазанкова // Метод. пособие. – М., 2001. – 32 с.
21. Казарцев, В.В. Унифицированная система биохимического контроля за состоянием обмена веществ коров / В.В. Казарцев, А.Н. Ратошный // Зоотехния. Вып.3, 1986 г. – С.323-330.
22. Котарев, В.И. Активность ферментов сыворотки крови и естественная резистентность баранов разных генотипов в зависимости от сезона года / В.И. Котарев, Е.А. Дуванова // Овцы, козы, шерстяное дело.- 2008.- № 4.- С. 24-26.
23. Красочки, П.А. Биотехнологические основы конструирования и использования иммунобиологических препаратов для молодняка крупного рогатого скота. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.03.23 – биотехнология. – Щелково. 2009. – 65 с.
24. Курзюкова, Т.А. Влияние дрожжевого пробиотика «Левиселл SC» на химический состав и физические свойства молока коров / Т.А. Курзюкова, Н.А. Крамаренко // Вестник КрасГАУ. – 2012. – №9. – С. 136-139.
25. Левахин, В.И. Интенсивность роста бычков при использовании в рационах пробиотика / В.И. Левахин, В.И. Швиндт, А.С. Коровин и др. // Вестник мясного скотоводства. – Оренбург. – 2005. – Вып. 58. – Т. II. – С.25.
26. Малик, Н.И. Ветеринарные пробиотические препараты / Н.И. Малик, А.Н. Панин // Ветеринария. – 2001. – №1. – С. 46-51.
27. Методика зоотехнического и биохимического анализа кормов, продуктов обмена и животноводческой продукции / Раецкая Ю.И., Сухарева В.Н. и др.- Дубровицы: ОНТИ, 1970.- 128 с.

28. Некрасов, Р.В. Система кормления свиней на доращивании и откорме с использованием про- и пребиотиков / Р.В. Некрасов, Е.А. Махаев, В.Н. Виноградов, Н.А. Ушакова - Дубровицы: ВИЖ, 2010.- 116 с.
29. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие / Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова.- М., 2003.- 456 с.
30. Панин, А.Н. Исследование антагонистических свойств спорообразующих бактерий *Bacillus subtilis* в отношении ацидофильных бактерий *Lactobacillus acidophilus* / А.Н. Панин, Н.И. Малик // Ветеринарный врач.- 2009.- №6.- С 13-16.
31. Панин, А.Н. Пробиотические препараты в ветеринарии / А.Н. Панин, Н.И. Малик, Е.В. Малик // Ветинформ. – 1993. – №2. – С. 9-10.
32. Панин, А.Н. Принципы и перспективы применение пробиотиков в животноводстве и ветеринарии / А.Н. Панин, Н.И. Малик // Материалы Всееср. конф. Пробиотики и пробиотические продукты в профилактике и лечении наиболее распространенных заболеваний человека. – М., 1999. – С. 22-23.
33. Похilenко, В.Д. Пробиотики на основе спорообразующих бактерий / В.Д. Похilenко, В.В. Перелыгин // Химическая и биологическая безопасность. – 2007. – №2-3. – С. 20-41.
34. Тагиров, Х.Х. Переваримость и использование питательных веществ и энергии корма при введении в рацион пробиотической кормовой добавки «Биогумитель» / Х.Х. Тагиров, Ф.Ф. Вагапов, И.В. Миронова // Вестник мясного скотоводства. – 2012. – Т. 3. – №77. – С. 79-84.
35. Тараканов, Б.В. Состояние и перспективы использования пробиотиков в животноводстве // Проблемы кормления с.-х. ж.-х. в соврем. условиях развития животноводства.- Дубровицы, ВИЖ, 2003.- С.106.
36. Тараканов, Б.В. Биопрепараты для повышения эффективности использования кормов // Зоотехния. – 1993. – № 8. – с.16-18.
37. Тараканов, Б.В. Механизмы действия пробиотиков на микрофлору пищеварительного тракта и организм животных // Ветеринария. – 2000. – №1. – С.47-54.
38. Тараканов, Б.В. Пробиотики. Достижения и перспективы использования в животноводстве / Б.В. Тараканов, Т.А. Николичева, В.В. Алешин // Прошлое, настоящее и будущее зоотехнической науки : тр. / ВИЖ. – Дубровицы, 2004. – Вып. 62, т. 3. – С. 69-73.Ушакова, Н.А. Анаэробная твердофазная ферментация растительных субстратов с использованием *Bacillus subtilis* / Н.А. Ушакова, Е.С. Бродский, А.А. Козлова, А.В. Нифатов // Прикладная биохимия и микробиология. – 2009. – Т. 45. – № 1. – С. 70-77.
39. Ушакова, Н.А. Выделение соматостатин-подобного пептида *Bacillussubtilis* B-8130, кишечного симбионта дикой птицы *Tetraourogallus*, и влияние бациллы на животный организм/ Н.А.Ушакова, В.В.Вознесенская, А.А.Козлова, А.В.Нифатов, Д.С.Павлов и др./ Доклады АН, Раздел: Общая биология.-2010.-Т.434.-№2.-С.282-285.

40. Ушакова, Н.А. Выделение соматостатин-подобного пептида клетками *Bacillus subtilis* B-8130, кишечного симбионта дикой птицы *Tetrao urogallus*, и влияние бациллы на животный организм / Н.А. Ушакова, В.В. Вознесенская, А.А. Козлова, А.В. Нифатов, В.А. Самойленко, Р.В. Некрасов, И.А. Егоров, Д.С. Павлов // Доклады РАН. – 2010. – Т. 434. – № 2. – С. 282-285.
41. Ушакова, Н.А. Новое поколение пробиотических препаратов кормового назначения. / Н.А. Ушакова, Р.В. Некрасов, В.Г. Правдин, Л.З. Кравцова, О.И. Бобровская, Д.С. Павлов // Scientific Reviews. – 2012. – №1. – С. 184-192.
42. Ушакова, Н.А. Пробиотик из *Bacillus subtilis* 8130 кормового назначения – природный стимулятор пищеварения // Материалы III Моск. Междунар. конгр. «Биотехнология: состояние и перспективы развития». – М., 2005. – Ч.1. – С. 303.
43. Ушакова, Н.А. Разработка пробиотического препарата для животных с использованием ассоциации *Bacillussubtilis* и *Enterococcusfaecium*/ Н.А. Ушакова, Е.В. Котенкова, А.А. Козлова, Е.В. Федосов, Р.В. Баслеров // Успехи современной биологии. – 2011, том 131. - №1. – С. 64-69.
44. Ушакова, Н.А. Способ получения биологически активной кормовой добавки из растительного сырья / Н.А. Ушакова, Е.И. Наумова, Д.С. Павлов, Б.А. Чернуха // Патент РФ №2202224, 20.04.2003.
45. Холодов, В.М. Справочник по ветеринарной биохимии / В.М. Холодов, Г.Ф. Ермолаев // Минск, 1988. – С.139-167.
46. <http://agropost.ru/skotovodstvo/kormlenie-krs/vliyanie-bioplyus2b-na-produktivnost-krs.html>
47. <http://genetika.ru/vkpm/>